



Bio-Imagenes Group

Servicio de Diagnostico por Imágenes

COLON POR ENEMA

DOBLE CONTRASTE con Nigalax y Limonada

Por favor, siga las siguientes indicaciones para la realización del estudio.

DIA ANTERIOR AL ESTUDIO:

| | |
|-----------|--|
| Desayuno: | Te o jugos de frutas azucarados (colados). |
| Almuerzo: | Caldo desgrasado. 1 vaso de jugo de pomelo o naranja (colado). 100 gramos de jalea de Membrillo o gelatina. 1 vaso de agua o te azucarados. |
| Hora 13: | Tomar por lo menos 1 vaso grande de jugos de fruta colado, o te azucarado. |
| Hora 15: | Tomar por lo menos 1 vaso grande de jugos de fruta colado, o te azucarado. |
| Hora 20: | Cena igual al almuerzo. |
| Hora 21: | Tomar 200cc. de limonada Roge. |
| Hora 23: | Tomar 6 grageas de Nigalax Radiológico con 1 vaso grande de agua (tomar 2 comprimidos cada 5 minutos). |
| Hora 24: | Tomar por lo menos 1 vaso grande de agua o te azucarado. |

DIA DEL ESTUDIO:

Ayuno total.

Traer radiografías de colon por enema (si tiene).

SI EL PACIENTE SE ENCUENTRA TOMANDO OTROS MEDICAMENTOS NO DEBE SUSPENDERLOS A EXCEPCION QUE SE HALLE EN TRATAMIENTO DE DIABETES, EN CUYO CASO, DEBERA CONSULTAR CON SU MEDICO TRATANTE LA ADAPTACIÓN DE LA MEDICACIÓN.

Presentarse con receta autorizada y DNI.